



POSSO FARE TRANQUILLAMENTE LE RADIOGRAFIE DENTALI IN GRAVIDANZA? NO!

Le radiografie endorali (cioè radiografie specifiche per l'area interna della bocca) durante la gravidanza possono suscitare preoccupazioni.

Questo è dovuto alla potenziale esposizione ai raggi X, che, sebbene siano di basso livello nelle procedure dentistiche, possono comunque causare apprensione considerando la necessità di proteggere il feto da possibili rischi.

È preferibile evitarle, soprattutto nel primo trimestre. Tuttavia, in alcune situazioni, possono essere necessarie per diagnosticare e trattare problemi dentali che potrebbero influire sulla salute della madre o del bambino.

È importante discutere con il dentista e il medico per valutare i rischi e i benefici. Le radiografie dovrebbero essere eseguite con precauzioni, utilizzando tecniche a bassa radiazione e dispositivi di protezione. L'esposizione ai raggi X dovrebbe essere limitata all'area specifica necessaria.

In generale, le radiografie non urgenti possono essere posticipate fino al secondo o terzo trimestre.

La decisione finale dovrebbe essere il risultato di una valutazione personalizzata per ciascun caso e di una comunicazione trasparente e aperta tra il paziente, il dentista e il medico di riferimento.

Bibliografia

<https://www.andi.it/wp-content/uploads/2020/09/Q2.pdf>

Il trattamento odontoiatrico in gravidanza, nei primi anni di vita e nel disabile

American Dental Association. *Dental radiographic examinations: recommendations for patient selection and limiting radiation exposure*. American Dental Association; 2012.

American Academy of Pediatrics. American College of Obstetricians and Gynecologists; Committee on Obstetric Practice. *The Apgar score*. *Adv Neonatal Care*. 2006; 6:220-3.

Progetto realizzato da



Con la collaborazione di

